



Buctril®

Description

Herbicide contre dicotylédones annuelles pour légumes et maïs.

Matière active

225 g/l Bromoxynil

Formulation

EC (concentré émulsionnable)

Fenêtres d'application

Oignons: post-levée, stade 1-3 feuilles (BBCH 11-13)
Maïs sucré, maïs: post-levée, stade 2-6 feuilles (BBCH 12-16)

Cultures

Oignons, maïs sucré, maïs

Dosages

Oignons: 1,0 l/ha (quantité totale homologuée);
emploi uniquement en splits avec max. 0,5 l/ha
Maïs sucré, maïs: 1,0-1,5 l/ha

Emballage

1 l (12 x 1 l)

Plus d'informations

Bayer (Schweiz) AG
Crop Science
Case postale
3052 Zollikofen
Téléphone: 031 869 16 66
www.agrar.bayer.ch

Employer les produits phytosanitaires avec précaution.
Avant utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et les informations sur l'étiquette. Observer les phrases et symboles de danger.

Bayer (Schweiz) AG · 3052 Zollikofen · Téléphone: 031 869 16 66 · www.agrar.bayer.ch

Buctril contient Bromoxynil. Appliquer les produits phytosanitaires avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit. Observer les symboles et indications de danger.

Mode d'action

Buctril est un herbicide de contact contre les dicotylédones uniquement. Les adventices doivent être levées lors du traitement. La matière active Bromoxynil est absorbée par les feuilles et agit dans les cellules foliaires. Elle interfère dans le processus de la photosynthèse.

Emploi sur légumes

Oignons pour condiments, oignons potagers

1,0 l/ha (quantité totale homologuée, emploi uniquement en traitements fractionnés avec max. 0,5 l/ha).

Traiter au stade 1-3 feuilles de la culture (BBCH 11-13). Suite de traitements: 2 x 0,5 l/ha ou 3 x 0,33 l/ha.

Mélanges possibles mais uniquement avec Bandur, consulter notre service technique surtout pour ce qui concerne le dosage.

Oignons en botte (seul. Buctril, pas de mélange avec Bandur)

Même emploi que pour les oignons pour condiments et oignons potagers ci-dessus. Délai d'attente: 28 jours.

Maïs sucré

Même emploi que pour le maïs ci-dessous. Délai d'attente: 60 jours.

Emploi sur grandes cultures

Maïs

1,0-1,5 l/ha (dosages homologués, dosages inférieurs possibles).

Traiter en post-levée au stade 2-6 feuilles du maïs (BBCH 12-16), l'optimal se situant au stade BBCH 14-16.

Buctril est bien adapté comme traitement de correction ciblé après un premier traitement avec un herbicide racinaire ainsi que lors d'une efficacité insuffisante d'autres traitements herbicides.

Un mélange avec Laudis est possible, consulter notre service technique concernant les dosages en mélange.

Spectre d'efficacité Buctril + Bandur

	Buctril	Bandur	Buctril + Bandur
Dicotylédones annuelles			
Amarantes	●	●	●
Bleuet	●		●
Capselle bourse à past.	●	●	●
Matricaire camomille	●		●
Coquelicot	●		●
Ethuse ciguë	●		●
Euphorbe réveille-matin		●	●
Chénopodes	●	●	●
Fumeterre officinale	●		●
Gaillet gratteron	●	●	●
Galinsoge à p. fleurs	●	●	●
Géraniums	●		●
Laiteron annuel	●		●
Lamier pourpre	●	●	●
Mercuriale annuelle	●	●	●
Morelle noire	●		●
Mouron des oiseaux		●	●
Moutarde des champs	●		●
Myosotis des champs	●		●
Ortie royale	●	●	●
Pensée des champs		●	●
Ravanelle	●		●
Renouée liseron	●	●	●
Renouée des oiseaux	●	●	●
Renouée persicaire	●	●	●
Séneçon vulgaire	●		●
Tabouret des champs	●	●	●
Véroniques	●		●
Vesce	●		●
Graminées			
Agrostide jouet du vent		●	●
Pâturin annuel		●	●
Ray-grass		●	●
Vulpin des champs		●	●
Millets			
Digitaires		●	●
Sétaires		●	●
Panic pied de coq		●	●
Panic dichotome		●	●
Diverses			
Ambrosie	●		●
Repousses de p. d. t.	●		●
Repousses de colza	●		●
Repousses de tournesol	●		●
● Effet bon à très bon ● Effet suffisant à bon			

Fenêtres d'application sur oignons (sans oignons en botte)

Stade	Image	Produit	Dosage	Remarques
Semis 00				
Flagelle avancée 10				
1 ^{ère} feuille 11				
5 ^{ème} feuille 15				
Feuillage 40-49				
Fin de croissance 90-99				
Adventices pré-levée				
Adventices post-levée				
				Remarques
		Bandur 3,0 l/ha	seulement sur cultures plantées	● Pas sur sols sableux et sur oignons semés.
		Buctril + Bandur	Traitement fractionnés: 1 ^{er} split: Buctril 0,3 l/ha + Bandur 0,3 l/ha 2 ^{ème} split: Buctril 0,3 l/ha + Bandur 0,3-0,5 l/ha 3 ^{ème} split: Buctril 0,4 l/ha + Bandur 0,5 l/ha	● Dès 1 feuille, selon conseils. Pas sur sols sableux.
		Boxer 4,0 l/ha		● Au stade 1 à 3 feuilles. Pas sur sols légers avec moins de 1 % d'humus.