



Herold<sup>®</sup>  
SC

# Contrôle total des adventices en automne

Bayer (Schweiz) AG  
Crop Science  
3052 Zollikofen ·  
Téléphone: 031 869 16 66 ·  
[www.agrar.bayer.ch](http://www.agrar.bayer.ch)

Herold SC contient du Flufenacet et du Diflufénican.  
Observer les indications de risques et de dangers sur les emballages.



Science For A Better Life

En agriculture intensive, une lutte précoce contre les mauvaises herbes s'avère primordiale pour que la culture se développe à l'abri de toute concurrence néfaste à l'obtention d'un rendement élevé. Le désherbage d'automne est donc une mesure bien adaptée pour les céréales d'automne semées tôt.

» **L'emploi:** Herold SC est efficace contre les mauvaises herbes dans toutes les céréales d'automne, sauf l'avoine. Les graminées résistantes à l'Isoproturon et aux sulfonyles sont aussi éliminées.

Herold SC agit sur les adventices en cours de germination jusqu'au stade 2 feuilles. Le stade idéal d'application se situe en cours de levée jusqu'au stade 3 feuilles de la céréale. Ne pas traiter sur des sols très légers et sur des cultures affaiblies ou sur des parcelles avec une profondeur de semis irrégulière ou trop superficielle.

» **Dosages d'Herold SC en fonction de la flore adventice:**

- 0,4 l/ha contre agrostide jouet du vent et pâturins et lors d'un enherbement normal en dicotylédones. En règle générale, ce dosage suffit. Cependant, lors d'un enherbement important en gaillet ou matricaire camomille, il sera peut-être nécessaire de procéder à un traitement de correction au printemps avec 0,1 l/ha Primus.
- 0,6 l/ha contre graminées et dicotylédones (incl. gaillet et matricaire camomille)
- 0,4 l/ha + 2,0 l/ha IPU contre graminées et lors d'un enherbement normal en dicotylédones (incl. matricaire camomille). Ne pas ajouter d'IPU en pré-levée.
- 0,6 l/ha + 1,0 l/ha IPU lors d'un enherbement important en vulpin et ray-grass (max. 2 feuilles). Ne pas ajouter d'IPU en pré-levée.
- 0,4-0,5 l/ha + 0,5 l/ha Othello lors d'un enherbement important en vulpin résistant aux FOP's et à l'IPU. Uniquement dans le blé d'automne dès le stade 3 feuilles de la culture (BBCH 13).

Traitement soit en pré-levée (selon PER jusqu'au 10 octobre) ou en post-levée précoce (selon PER jusqu'au 31 octobre), indépendamment du stade de la culture mais au maximum jusqu'à mi-tallage (BBCH 24). Aucune restriction variétale, emploi sur orge hybride sans restriction. Prudence sur seigle hybride.

En situation extrême, avec une importante levée tardive de vulpin des champs et/ou beaucoup de ray-grass d'Italie, il sera peut-être nécessaire de procéder à un traitement de rattrapage au printemps avec un produit graminicide comme Pacifica Plus (blé, blé dur, triticale), Hussar Duo (blé, seigle, triticale, épeautre) ou Puma Extra (blé, orge, seigle, triticale, épeautre). Hussar Duo, Puma Extra: seulement si vulpin des champs non résistant aux FOP's.



**Matières actives**  
200 g/l Diflufenican  
400 g/l Flufenacet

**Formulation**  
SC (suspension concentrée)

**Cultures**  
Orge, blé, triticale, seigle

**Dosage**  
0,4—0,6 l/ha

**Fenêtre d'application**  
Pré-levée jusqu'à 3 feuilles des céréales (BBCH 00–24)

**Emballage**  
1 l, (12 x 1 l)

**Plus d'informations**  
[www.agrar.bayer.ch](http://www.agrar.bayer.ch)

**Spectre d'efficacité d'Herold SC**

	0,4 l/ha	0,6 l/ha		0,4 l/ha	0,6 l/ha
<b>Dicotylédones</b>			<b>Graminées</b>		
Capselle bourse à pasteur	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Agrostide jouet du vent	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Coquelicot	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Pâturins	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Gaillet gratteron	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Ray-grass (semences)*	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Lamier pourpre	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Vulpin*	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Matricaire camomille*	■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Mouron des oiseaux	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	<b>Efficacité</b>		
Moutarde des champs	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Très bonne	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Ortie royale	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Bonne	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Ravenelle	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Suffisante	■ ■ ■	■ ■ ■
Renouée persicaire	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Partielle	■ ■ ■	■ ■ ■
Renouée des oiseaux	■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Pensée des champs	■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Véronique à feuilles de lierre	■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Véronique de Perse	■ ■ ■	■ ■ ■ ■			

\* effet renforcé avec Isoproturon

